

IMPFAMPEL

Für Menschen mit geschwächtem Immunsystem

LEBEND-IMPfstOFFE nach Einzelfallprüfung!	⊗ Gelbfieber ³
	⊗ Herpes zoster
	⊗ Masern ¹
	⊗ Typhus (oral) ³
	⊗ Varizellen ²

TOT-IMPfstOFFE geeignet	✓ Cholera ³
	✓ Diphtherie ^{1,*}
	✓ Frühsommer-Meningoenzephalitis ^{3,*}
	✓ Hepatitis A ^{3,*} + B ^{2,3,*}
	✓ Influenza ²
	✓ Meningokokken ACWY ²
	✓ Meningokokken B ²
	✓ Pertussis ¹
	✓ Pneumokokken (sequenzielle Impfung) ^{2,#}
	✓ Poliomyelitis (IPV) ¹
	✓ Tetanus ^{1,*}
	✓ Tollwut ^{3,*}
	✓ Herpes Zoster ²

- Standardimpfungen im Erwachsenenalter
- Indikationsimpfungen, u. a. empfohlen für Menschen mit einer Immunschwäche, im Vorfeld einer immunsuppressiven Therapie oder Organtransplantation
- Reiseimpfungen

* Bei diesen Impfungen sollten sie mit Ihrem Arzt über eine Titerkontrolle sprechen. Zeigt diese eine zu niedrige Antikörperkonzentration sollte eine Auffrischung bis spätestens zwei Wochen vor Beginn einer immunsupprimierenden Therapie, bzw. einer Transplantation erfolgt sein.

Sequenzielle Impfung mit einem 13-valenten Konjugatimpfstoff gefolgt von einer Impfung mit einem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff nach 6-12 Monaten

Quelle:
Epidemiologisches Bulletin 34/2020

Wagner N et al. Bundesgesundheitsblatt 2019;62:494-515